


Situation hydrologique du bassin Rhône-Méditerranée et de la région Auvergne-Rhône-Alpes au 1^{er} juillet 2026

Météo et humidité des sols	↘	GE et BFC : Le seuil des très fortes chaleurs (35 °C) a été atteint le dernier week-end de juin. Des averses orageuses localisées ont touché la région lundi et le Jura mercredi, sans effet sur les sols très secs. De fortes températures (>33°C) sont de nouveau prévues en fin de semaine et la semaine prochaine, sans perspective de précipitations.								
	=	AURA RMed : Malgré une baisse des températures depuis le début de la semaine, les sols restent secs, sauf dans les Alpes. L'Ardèche et la Drôme sont en danger élevé concernant le risque de feu de forêt. Les prévisions indiquent une hausse progressive des températures.		=	AURA LB/AG : Les sols restent secs et déficitaires en pluie, malgré les précipitations du début de semaine, qui sont restées faibles. Les températures ont toutefois baissé par rapport à la semaine dernière, mais leur hausse devrait reprendre dans les prochains jours.					
	↘	PACA : 42 °C mesurés aux Arcs dans le Var dimanche 28 juin. De violents orages ont touché les Alpes du Sud la semaine dernière et des averses ont touché la Provence et le littoral cette semaine. Les sols restent secs, voire exceptionnellement secs sur le Var et le littoral azuréen. Les fortes chaleurs (>33 °C) vont persister sur toute la région cette semaine et la semaine prochaine, et les rares précipitations prévues resteront très localisées sur les reliefs.								
	↘	OCC : Le seuil des très fortes chaleurs (35 °C) a été dépassé la semaine dernière et sera à nouveau dépassé dès la fin de semaine, sans aucune perspective de précipitations. Les sols sont secs sur la région et exceptionnellement secs sur l'arrière-pays de l'Hérault et du Roussillon.								
Cours d'eau et milieux aquatiques	↘	GE et BFC : La situation s'aggrave. Les débits passent sous les seuils d'alerte sur les plateaux du Jura et alerte renforcée sur les reliefs, avec des situations inquiétantes pour les milieux (signalements d'assecs sur le Doubs). Les débits passent sous les seuils d'alerte renforcée et de crise sur les affluents de la Saône.								
	=	AURA RMed : En dehors de l'amont des Alpes, les débits restent faibles à très faibles. Environ 15 % des cours d'eau sont notés en assec ou écoulement non visible (réseau ONDE).		=	AURA LB/AG : La situation s'est améliorée suite aux pluies récentes. Mais la moitié des débits mesurés reste sous les seuils d'alerte, certains sous le seuil de crise.					
	↘	PACA : Les cours d'eau de la vallée du Rhône et du littoral sont fortement impactés par la chaleur, avec des débits qui faiblissent rapidement et passent sous les seuils d'alerte. Les épisodes orageux ont pu améliorer les débits localement sur les reliefs, mais la situation devient fragile.								
	↘	OCC : Forte dégradation de l'hydrologie des cours d'eau sur tous les départements, en particulier sur les têtes de bassins versants. Situation de sécheresse sévère sur l'Hérault amont, début d'assecs dans l'Aude, l'Hérault et le Gard.								
Nappes souterraines	↘	GE et BFC : La tendance reste à la baisse, avec des niveaux désormais modérément bas sur les nappes de Franche-Comté et proches des normales sur les nappes alluviales de la Saône.								
	=	AURA RMed : Tendance générale à la baisse, notamment sur les nappes alluviales réactives (Rhône, Saône, Combe de Savoie) mais aussi sur les nappes inertielles (Rhône moyen). Poursuite de la dégradation sur la Molasse Miocène du Bas Dauphiné en Drôme des collines et du secteur Sud-Ouest de la Dombes.		=	AURA LB : Situation très hétérogène au niveau des nappes de la Chaîne des Puys, de très basse à sous la moyenne. Les niveaux des nappes alluviales de la Loire et de l'Allier (amont) continuent de se dégrader.					
	↘	PACA : La vidange se généralise, mais les niveaux restent globalement proches des normales sur les nappes inertielles et réactives. Localement, les niveaux sont modérément bas sur les nappes côtières très réactives.								
	↘	OCC : Dans les Pyrénées-Orientales, les nappes plio-quaternaires du secteur des Aspres sont en niveau de crise, la bonne recharge hivernale n'ayant pas compensé le déficit lié à la sécheresse pluriannuelle subie depuis 2022. La tendance à la baisse se confirme sur les nappes du Gard et du Roussillon, qui conservent toutefois des niveaux modérément hauts. La vidange se poursuit sur les autres nappes de la région, avec des niveaux proches des normales.								
Situation par rapport aux normales de saison		Normale	Légèrement inférieure	Inférieure	Très inférieure	Records bas	Tendance depuis le précédent bulletin	Amélioration ↗	Stabilité =	Dégradation ↘

Évolution des restrictions sur le bassin Rhône-Méditerranée et la région Auvergne-Rhône-Alpes du 24 juin au 1^{er} juillet 2026



Bassin Rhône-Méditerranée : Arrêtés cadre interdépartementaux												Bassin Loire-Bretagne : Grands axes soutenus									
Allan			Axe Saône							Siagne Durance Verdon			Allier			Loire					
			amont		moyen	aval				Serre-Ponçon	Sainte-Croix Castillon	Saint-Cassien	amont	moyen	aval	amont		moyen		aval	
90	70	25	88	70	21	71	01 sup.	01 sout.	69				43	63	03	07	43	43	42	03	
=	↘	=	↘	↘	↘	↘	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=		

Niveau de restriction	Pas de restriction	Vigilance	Alerte	Alerte renforcée	Crise	Tendance depuis le précédent bulletin	Amélioration ↗	Stabilité =	Dégradation ↘
-----------------------	--------------------	-----------	--------	------------------	-------	---------------------------------------	----------------	-------------	---------------