


Situation hydrologique du bassin Rhône-Méditerranée et de la région Auvergne-Rhône-Alpes au 8 juillet 2026

Météo et humidité des sols	=	GE et BFC : Le seuil des très fortes chaleurs (35 °C) a de nouveau été dépassé toute cette semaine, sans précipitations significatives. La sécheresse des sols atteint des records bas, y compris sur les reliefs. Des températures caniculaires sont de nouveau prévues en fin de semaine et la semaine prochaine, avec néanmoins des passages orageux possibles dès samedi, pouvant être violents localement.									
	↘	AURA RMed : L'absence de précipitations ces derniers jours continue d'aggraver l'assèchement des sols. Des risques d'orages sont annoncés pour la fin de semaine, sans baisse des températures.					=	AURA LB/AG : L'absence de précipitations ces derniers jours continue d'aggraver l'assèchement des sols, surtout dans le nord de l'Auvergne. Des risques d'orages sont annoncés pour la fin de semaine, sans baisse des températures.			
	=	PACA : Températures inédites mesurées sur le littoral des Bouche-du-Rhône cette semaine (> 40 °C). Les seules précipitations significatives se sont limitées aux reliefs. Les très fortes chaleurs vont perdurer sur la vallée du Rhône et la Provence. Des orages parfois violents pourraient toucher les sols très secs de la région dès cette fin de semaine, mais se limiter aux reliefs la semaine prochaine.									
	=	OCC : Les températures sont restées caniculaires cette semaine (> 40 °C à Montpellier et Perpignan) et les sols sont extrêmement secs sur l'arrière-pays. Une légère baisse des températures est possible dès cette fin de semaine , avec des orages localement violents prévus sur les Cévennes et les reliefs pyrénéens, mais peu de probabilité de précipitations sur le littoral du Roussillon.									
Cours d'eau et milieux aquatiques	=	GE et BFC : Les débits atteignent désormais les seuils d'alerte renforcée et de crise sur la majorité des cours d'eau de la région, avec un nombre inédit de petits cours d'eau en assec et écoulement non visible. La hausse des températures des cours d'eau affecte fortement les milieux aquatiques.									
	↘	AURA RMed : Les débits restent à des valeurs très faibles, la situation devient critique en Ardèche et en Haute-Savoie. Des cours d'eau alpins passent sous le Débit Minimum Biologique (> 20°C, eutrophisation).					↘	AURA LB/AG : Les débits restent à des valeurs très faibles. La moitié des débits mesurés sont sous les seuils d'alerte renforcée, certains sous le seuil de crise (mortalités piscicoles, nombre inédit d'assecs).			
	↘	PACA : Les débits sont en baisse rapide, avec des températures de l'eau élevées sur les cours d'eau côtiers, très élevées (jusqu'à 30 °C) dans les Alpes-Maritimes, impactant fortement les milieux (assecs). Certains tronçons de la Durance passent sous les seuils de vigilance, voire d'alerte.									
	↘	OCC : La situation se dégrade très rapidement sur le Gard, l'Hérault et l'Aude (écoulements faibles et assecs, hausse de la température de l'eau). Les débits sont sous les seuils d'alerte et d'alerte renforcée sur les bassins de l'Aude, de l'Orb et du Fresquel, voire sous le seuil de crise sur le Jaur.									
Nappes souterraines	=	GE et BFC : La tendance reste à la baisse et la vidange s'accroît sur les nappes réactives, en l'absence de pluies efficaces sur le mois de juin. Les niveaux sont modérément bas sur les nappes de Franche-Comté et proches des normales sur les nappes alluviales de la Saône. La situation est plus favorable qu'en 2022 et 2023, mais risque de se dégrader rapidement.									
	=	AURA RMed : Dégradation progressive de la situation sur les nappes inertielles du Rhône Moyen, avec un risque d'évolution défavorable dès août. Situation dégradée et modérément basse sur les nappes alluviales réactives (Rhône, Guiers, Combe de Savoie). Situation basse sur le Pliocène du Val de Saône.					=	AURA LB : Situation toujours très hétérogène au niveau des nappes de la Chaîne des Puys, de très basse à moyenne. Les niveaux des nappes alluviales de la Loire et de l'Allier (amont) continuent de se dégrader, en particulier sur l'Allier amont avec des niveaux jusqu'à très bas.			
	=	PACA : La vidange se poursuit, les niveaux restent globalement proches des normales. Ils sont localement modérément bas sur les nappes réactives côtières et modérément hauts sur les nappes alluviales du Rhône inférieur.									
	=	OCC : Les nappes plio-quaternaires du secteur des Aspres sont en niveau de crise. La tendance reste à la baisse, avec des niveaux modérément hauts à hauts pour les nappes des formations de la Vistrenque, de l'Astien à Agde et les nappes alluviales de la plaine du Roussillon, et proches des normales sur le reste de la région. La situation est plus favorable qu'en 2023, mais similaire à celle de 2022.									
Situation par rapport aux normales de saison		Normale	Légèrement inférieure	Inférieure	Très inférieure	Records bas	Tendance depuis le précédent bulletin	Amélioration ↗	Stabilité =	Dégradation ↘	

Évolution des restrictions sur le bassin Rhône-Méditerranée et la région Auvergne-Rhône-Alpes du 1^{er} au 8 juillet 2026



Bassin Rhône-Méditerranée : Arrêtés cadre interdépartementaux

Allan			Axe Saône						
			amont		moyen	aval			
90	70	25	88	70	21	71	01 sup.	01 sout.	69
↘	=	↘	↘	=	↘	↘	=	=	↘

Siagne Durance Verdon		
Serre-Ponçon	Sainte-Croix Castillon	Saint-Cassien
=	=	=

Bassin Loire-Bretagne : Grands axes soutenus

Allier			Loire					
amont	moyen	aval	amont		moyen		aval	
43	63	03	07	43	42	42	03	
=	=	=	=	=	=	=	=	

Niveau de restriction	Pas de restriction	Vigilance	Alerte	Alerte renforcée	Crise
-----------------------	--------------------	-----------	--------	------------------	-------

Tendance depuis le précédent bulletin	Amélioration ↗	Stabilité =	Dégradation ↘
---------------------------------------	----------------	-------------	---------------