


Situation hydrologique du bassin Rhône-Méditerranée et de la région Auvergne-Rhône-Alpes au 15 juillet 2026

Météo et humidité des sols	↗	GE et BFC : Les précipitations du début de semaine sont restées faibles et localisées. La région est cependant en Vigilance canicule et orages, de très forts orages sont en cours (risque de grêle) et risquent de se poursuivre jusqu'à dimanche, avec danger de ruissellement sur les sols très secs. Les températures devraient revenir dans les normales la semaine prochaine.	
	=	AURA RMed : Les orages sont restés localisés sur les reliefs le week-end dernier, avec de très fortes températures (+ de 38°C le 14 juillet). La région est en Vigilance orange canicule et orages, de violents orages sont en cours jusqu'à samedi (risque de grêle) et les températures restent élevées.	= AURA LB/AG : Les précipitations orageuses du week-end dernier se sont concentrées sur la moitié sud de l'Auvergne. Les températures sont restées très élevées. Les sols sont extrêmement secs. Des orages, localement violents, sont en cours sur toute la région jusqu'à vendredi soir. Le temps redeviendra sec et chaud à partir de samedi.
	=	PACA : Des précipitations orageuses localisées ont touché les Alpes du Sud et la Provence ce week-end, et couvrent toute la région ce jeudi, avec peu d'effet sur la sécheresse des sols. Les températures sont restées caniculaires et vont le rester la semaine prochaine, avec une faible probabilité de précipitations.	
	=	OCC : Les températures sont restées caniculaires cette semaine (38,7 °C à Uzès dans le Gard le 14 juillet) avec très peu de précipitations. Les sols sont extrêmement secs sur l'arrière-pays et s'assèchent rapidement sur le littoral. Des orages, localement violents, sont en cours jusqu'à vendredi. Quelques précipitations sont prévues dimanche, mais les températures risquent de rester très élevées.	
Cours d'eau et milieux aquatiques	↘	GE et BFC : Les débits sont désormais passés majoritairement sous les seuils d'alerte renforcée et de crise, avec une rapide dégradation en Franche-Comté et un nouveau record de petits cours d'eau en assec et écoulement non visible. Les milieux aquatiques restent fortement impactés (fortes mortalités piscicoles).	
	↘	AURA RMed : La baisse des débits est inquiétante, proche de la crise, sur les cours d'eau des massifs (importantes mortalités piscicoles). Les débits sont très faibles en têtes de bassin et faibles sur les cours d'eau principaux (fort taux d'assecs et d'écoulements faibles).	↘ AURA LB/AG : Forte accélération de la baisse des débits, les cours d'eau ont peu réagi aux précipitations orageuses récentes. Nombreuses mortalités piscicoles observées et nouveau record de petits cours d'eau en assec et écoulement non visible (50%).
	↘	PACA : Les débits sont en baisse sur les cours d'eau jusqu'alors préservés des Alpes du Sud. La situation se dégrade dans le Vaucluse (assecs) et les températures de l'eau restent élevées sur les cours d'eau côtiers (impacts forts sur les milieux).	
	↘	OCC : La situation est très dégradée dans l'Aude et l'ouest de l'Hérault, et se fragilise dans les Pyrénées-Orientales et le Gard.	
Nappes souterraines au 1 ^{er} juillet	=	GE et BFC : La tendance reste à la baisse et la vidange s'accroît sur les nappes réactives, en l'absence de pluies efficaces sur le mois de juin. Les niveaux sont modérément bas sur les nappes de Franche-Comté et proches des normales sur les nappes alluviales de la Saône. La situation est plus favorable qu'en 2022 et 2023, mais risque de se dégrader rapidement.	
	=	AURA RMed : Dégradation progressive de la situation sur les nappes inertielles du Rhône Moyen, avec un risque d'évolution défavorable dès août. Situation dégradée et modérément basse sur les nappes alluviales réactives (Rhône, Guiers, Combe de Savoie). Situation basse sur le Pliocène du Val de Saône.	= AURA LB : Situation toujours très hétérogène au niveau des nappes de la Chaîne des Puys, de très basse à moyenne. Les niveaux des nappes alluviales de la Loire et de l'Allier (amont) continuent de se dégrader, en particulier sur l'Allier amont avec des niveaux jusqu'à très bas.
	=	PACA : La vidange se poursuit, les niveaux restent globalement proches des normales. Ils sont localement modérément bas sur les nappes réactives côtières et modérément hauts sur les nappes alluviales du Rhône inférieur.	
	=	OCC : Les nappes plio-quaternaires du secteur des Aspres sont en niveau de crise. La tendance reste à la baisse, avec des niveaux modérément hauts à hauts pour les nappes des formations de la Vistrenque, de l'Astien à Agde et les nappes alluviales de la plaine du Roussillon, et proches des normales sur le reste de la région. La situation est plus favorable qu'en 2023, mais similaire à celle de 2022.	

Situation par rapport aux normales de saison	Normale	Légèrement inférieure	Inférieure	Très inférieure	Records bas	Tendance depuis le précédent bulletin	Amélioration ↗	Stabilité =	Dégradation ↘
--	---------	-----------------------	------------	-----------------	-------------	---------------------------------------	----------------	-------------	---------------

Évolution des restrictions sur le bassin Rhône-Méditerranée et la région Auvergne-Rhône-Alpes du 8 au 15 juillet 2026



Bassin Rhône-Méditerranée : Arrêtés cadre interdépartementaux													Bassin Loire-Bretagne : Grands axes soutenus							
Allan			Axe Saône							Siagne Durance Verdon			Allier			Loire				
			amont		moyen	aval				Serre-Ponçon	Sainte-Croix Castillon	Saint-Cassien	amont	moyen	aval	amont		moyen		aval
90	70	25	88	70	21	71	01 sup.	01 sout.	69				43	63	03	07	43	42	42	03
=	↘	=	=	↘	=	=	=	=	=	↘	=	↘	=	=	=	=	=	=	=	=

Niveau de restriction	Pas de restriction	Vigilance	Alerte	Alerte renforcée	Crise	Tendance depuis le précédent bulletin	Amélioration ↗	Stabilité =	Dégradation ↘
-----------------------	--------------------	-----------	--------	------------------	-------	---------------------------------------	----------------	-------------	---------------