


Situation hydrologique du bassin Rhône-Méditerranée et de la région Auvergne-Rhône-Alpes au 29 juillet 2026

Météo et humidité des sols	↘	GE et BFC : Les précipitations sont déficitaires depuis le mois de mars sur la région et le déficit atteint des records en cette fin juillet. Un nouvel épisode de fortes chaleurs (36 à 39 °C) a débuté ce mardi et les sols restent extrêmement secs. Des orages sont cependant prévus dès ce vendredi, et les précipitations pourraient être quasi quotidiennes jusqu'à mercredi prochain. Les températures devraient rester au-dessus des normales.	
	=	AURA RMed : Les pluies localisées n'ont pas permis de réduire la sécheresse des sols, qui reste forte, notamment dans le Rhône et l'Ain. Les fortes chaleurs sont de retour, des pluies sont attendues à partir du dimanche 2 août.	= AURA LB/AG : Les pluies ont réduit la sécheresse des sols en Haute-Loire. Les sols restent globalement très déficitaires en eau. Les fortes chaleurs sont de retour, de la pluie est possible le lundi 3 août.
	=	PACA : Les précipitations de ce week-end ont permis de ré-humidifier les sols sur la basse vallée du Rhône, mais ont eu peu d'impact sur le reste de la région. Un nouvel épisode de chaleur a débuté mardi et devrait durer jusqu'à la fin de la semaine. Des orages, localement violents, pourraient toucher les Alpes-Maritimes et le Var ce week-end. Des précipitations sont prévues sur le reste de la région dès lundi prochain.	
	=	OCC : Les précipitations de dimanche dernier n'ont été significatives que sur le littoral languedocien. Les sols restent extrêmement secs sur le Roussillon, l'arrière-pays languedocien et les Cévennes. La région reste à l'écart des très fortes chaleurs. Des orages sont prévus sur les reliefs en fin de semaine, mais peu de précipitations sont annoncées sur le reste de la région jusqu'à mercredi prochain.	
Cours d'eau et milieux aquatiques	=	GE et BFC : La situation des cours d'eau est critique, avec des débits majoritairement sous les seuils de crise, notamment sur la Saône et ses affluents. Les milieux aquatiques sont fortement impactés, près de 50 % des petits cours d'eau sont en assec ou rupture d'écoulement.	
	=	AURA RMed : Les pluies ont permis des améliorations locales de la situation notamment dans les Alpes (Savoie et Drôme) mais la situation globale reste très dégradée. 35 % des petits cours d'eau sont en assec ou rupture d'écoulement.	= AURA LB/AG : Des cours d'eau de Haute-Loire repassent au dessus du débit de crise. Mais tous les départements auvergnats ont des zones en crise et la situation globale reste très dégradée. Près de 50 % des petits cours d'eau sont en assec ou rupture d'écoulement.
	↘	PACA : Dégradation très rapide sur les cours d'eau des Alpes du Sud et de Provence, les débits sont descendus sous les seuils d'alerte et les assecs se multiplient. La situation de la Durance amont se fragilise. Les milieux sont fortement affectés par la chaleur persistante.	
	↘	OCC : Les débits sont faibles à très faibles sur l'ensemble des cours d'eau de la région, avec une aggravation de la situation sur le Gard, l'Hérault et l'arrière-pays audois. Près de 40 % des petits cours d'eau sont en assec ou rupture d'écoulement et les milieux sont très impactés.	
Nappes souterraines au 15 juillet 2026	↘	GE et BFC : La situation se dégrade sur toute la région. Les niveaux des nappes réactives de Franche-Comté passent de modérément bas à bas, avec des niveaux exceptionnellement bas sur la nappe de la Savoureuse (90). Sur le couloir Saône, la vidange s'accroît sur les nappes réactives et inertielles, avec des niveaux désormais modérément bas.	
	↘	AURA RMed : La vidange se poursuit pour les nappes du couloir Rhône-Saône et des vallées des Alpes, avec des niveaux proches des normales à modérément bas, voire bas dans le Bas-Dauphiné.	↘ AURA LB : La situation se dégrade très vite sur la majorité des nappes du Massif Central, de la Chaîne des Puys et du Forez, avec des niveaux bas.
	=	PACA : La tendance est à la baisse modérée sur les nappes de Provence et du Rhône inférieur, avec des niveaux désormais globalement proches des normales. Ils restent stables sur les nappes du Bas-Rhône et de la Durance, mais sont localement modérément bas sur les nappes réactives côtières.	
	=	OCC : Les nappes alluviales de la plaine du Roussillon, des sables de l'Astien à Agde et la nappe des formations de la Vistrenque conservent des niveaux modérément hauts à hauts. La situation est plus contrastée pour les nappes cévenoles et celles des Corbières, ainsi que pour les nappes alluviales de l'Aude, de l'Hérault et de l'Orb, avec des niveaux en baisse, modérément hauts à modérément bas. Le secteur des Aspres reste en crise.	

Situation par rapport aux normales de saison	Normale	Légèrement inférieure	Inférieure	Très inférieure	Records bas	Tendance depuis le précédent bulletin	Amélioration ↗	Stabilité =	Dégradation ↘
--	---------	-----------------------	------------	-----------------	-------------	---------------------------------------	----------------	-------------	---------------

Évolution des restrictions sur le bassin Rhône-Méditerranée et la région Auvergne-Rhône-Alpes du 22 au 29 juillet 2026



Bassin Rhône-Méditerranée : Arrêtés cadre interdépartementaux													Bassin Loire-Bretagne : Grands axes soutenus							
Allan			Axe Saône							Siagne Durance Verdon			Allier			Loire				
			amont		moyen	aval				Serre-Ponçon	Sainte-Croix Castillon	Saint-Cassien	amont	moyen	aval	amont		moyen		aval
90	70	25	88	70	21	71	01 sup.	01 sout.	69				43	63	03	07	43	42	42	03
=	↘	=	=	↘	=	=	↘	↘	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	

Niveau de restriction	Pas de restriction	Vigilance	Alerte	Alerte renforcée	Crise	Tendance depuis le précédent bulletin	Amélioration ↗	Stabilité =	Dégradation ↘
-----------------------	--------------------	-----------	--------	------------------	-------	---------------------------------------	----------------	-------------	---------------