

BULLETIN DE SITUATION HYDROLOGIQUE

BASSIN RHÔNE-MÉDITERRANÉE

Août 2026 : Une nouvelle vague de chaleur, plus longue et plus intense, mais une fin de mois humide sur le sud-est du bassin



Une vague de chaleur exceptionnellement longue et intense a de nouveau touché le bassin au mois d'août 2026, aggravant la sécheresse des sols des Vosges aux Pyrénées-Orientales. Le bilan pluviométrique est déficitaire de 20 % sur le Languedoc-Roussillon et de 40 % sur le nord du bassin. Des orages ont apporté des cumuls importants en fin de mois sur la région PACA et la Drôme.



Les taux de remplissage au 1^{er} septembre 2026 des retenues de soutien d'étiage et multi-usages de Chassezac en Ardèche, du Languedoc-Roussillon et des Alpes du Sud sont supérieurs à ceux des 4 dernières années. La situation est moins favorable pour les retenues des Alpes du Nord et critique pour les canaux de Bourgogne.



Les débits du fleuve Rhône sont parmi les plus faibles jamais observés pour un mois d'août depuis 1920, et la situation d'étiage sévère est inédite sur la Saône. Les débits sont inférieurs à très inférieurs aux normales sur les cours d'eau du nord du bassin. Sur la moitié sud du bassin, la situation est plus contrastée, avec des débits proches des normales sur les cours d'eau du Languedoc-Roussillon et de Provence qui ont pu bénéficier de précipitations orageuses.




Au 1^{er} septembre 2026, la vidange s'accroît sur les nappes du nord du bassin avec des niveaux globalement modérément bas à bas. La baisse est plus modérée sur les nappes du sud du bassin, avec des niveaux globalement proches des normales à modérément hauts.


1. Point météorologique : précipitations, humidité des sols, températures

Été 2026

Bassin Rhône-Méditerranée
Nombre de jours de chaleur : températures maximales
supérieures ou égales à 35°C
Été 2026




Bassin Rhône-Méditerranée
Rapport à la normale 1991/2020 des précipitations
Été 2026



BILAN RÉGIONAL ÉTÉ 2026

Anomalies (*) de températures moyennes et de températures maximales




* référence 1991-2020

METEO FRANCE

BILAN RÉGIONAL ÉTÉ 2026


Déficit/excédent(*) de précipitations




* référence 1991-2020

METEO FRANCE


Pluviométrie mensuelle




Pluviométrie depuis septembre 2025




Précipitations efficaces



Humidité des sols



Températures



2. Situation des milieux aquatiques et de leurs habitats


La quatrième campagne de l'Observatoire national des étiages (ONDE) à l'échelle du bassin pour l'année 2026 a été réalisée du 23 au 27 août par les agents de l'Office français de la biodiversité (OFB).



Bassin Rhône-Méditerranée Campagne d'observation ONDE fin août 2026

Modalités d'écoulement

- Écoulement visible acceptable [297 stations, 40 %]
- Écoulement visible faible [189 stations, 25 %]
- Écoulement non visible [44 stations, 6 %]
- Assec [214 stations, 29 %]



Carte : DREAL ARA / CIDDAE / SIG

Source : OFB


3. Situation des retenues d'eau

Canaux VNF :

Au niveau national, le taux de remplissage des canaux VNF est en baisse : 29 % au 1^{er} septembre 2026, pour un taux moyen habituel de 48 % sur ces 10 dernières années.

Le taux de remplissage du Canal de Bourgogne versant Saône est en très nette baisse, 19 % au 1^{er} septembre contre 60 % au 1^{er} août 2026. À noter : le barrage de Panthier est vidé pour travaux.

La baisse est aussi marquée sur le Canal du Midi, avec un taux de remplissage de 31 % au 1^{er} septembre, contre 64 % au 1^{er} août 2026.



4. Hydrologie : cours d'eau, hydraulité, fleuve Rhône

Fleuve Rhône :

Le mois d'août 2026 reste marqué par une situation d'étiage exceptionnellement sévère. Les débits moyens mensuels demeurent très largement inférieurs aux moyennes historiques 1920-2026 et se classent parmi les plus faibles observés pour un mois d'août. La situation est particulièrement remarquable sur la Saône à Couzon, qui atteint le 1er rang des mois d'août les plus faibles depuis 1920, ainsi qu'à son aval sur le Rhône à Ternay (4e rang), Valence et Beaucaire (3e rang). Sur le Haut-Rhône, Bognes et Perrache se classent respectivement aux 8e et 6e rangs.

En limitant la comparaison aux années 1991-2025 (morphologie et aménagement actuel du fleuve), on retrouve les années 2022, 2023, 2025 et 2026 dans le top 5 des débits moyens les plus bas mesurés au mois d'août (sauf 2023 pour Bognes, enneigement légèrement supérieur aux normales cette année-là).

Classement des débits moyens les plus bas mesurés au mois d'août (en m³/s) depuis 1991

BOGNES	TERNAY (COUZON + PERRACHE)	VALENCE	BEAUCAIRE
283 (2025)	353 (2022)	471 (2022)	508 (2022)
289 (2011)	360 (2026)	530 (2026)	580 (2026)
316 (2022)	383 (2025)	534 (2025)	585 (2025)
320 (2026)	439 (2017)	617 (2017)	678 (2023)
329 (2005)	441 (2023)	632 (2023)	685 (2017)

Coefficient d'hydraulicité du fleuve Rhône sur 12 mois, de 2020 à 2026

	BOGNES	TERNAY	VALENCE	BEAUCAIRE
septembre 2020 – août 2021	1.12	1.12	1.06	0.99
septembre 2021 – août 2022	0.79	0.70	0.69	0.64
septembre 2022 – août 2023	0.93	0.74	0.71	0.67
septembre 2023 – août 2024	1.33	1.28	1.27	1.30
septembre 2024 – août 2025	0.95	0.90	0.90	0.99
septembre 2025 – août 2026	0.91	0.89	0.87	0.94

Source : Compagnie nationale du Rhône (CNR)

Bassin Rhône-Méditerranée

Suivi hydrologique des principaux cours d'eau

Hydraulicité mensuelle fin août 2026


Hydraulicité mensuelle $H(*)$:

- débit très supérieur à la moyenne ($H > 1.75$)
- débit supérieur à la moyenne ($1.25 < H < 1.75$)
- débit proche de la moyenne ($0.75 < H < 1.25$)
- débit inférieur à la moyenne ($0.25 < H < 0.75$)
- débit très inférieur à la moyenne ($H < 0.25$)
- Assec
- pas de données

Types des régimes hydrologiques du bassin

- glaciaire
- nival
- pluvial
- pluvial-méditerranéen ou cévenol
- pluvio-nival
- Corridor Rhône à régime influencé

Source de données: DREAL



$$* \text{ Hydraulicité } (H) = \frac{\text{débit moyen mensuel mesuré}}{\text{débit moyen mensuel calculé sur les années observées}}$$

Bassin Rhône-Méditerranée

Suivi hydrologique des principaux cours d'eau

Synthèse des écoulements à partir des débits minima sur 3 jours consécutifs fin août 2026


Débit d'été / VCN3 des cours d'eau (occurrence) :

- Période humide supérieure à 5 ans
- Période humide de 2 à 5 ans
- Période normale (inférieure à 2 ans)
- Période sèche de 2 à 5 ans
- Période sèche de 5 à 10 ans
- Période très sèche supérieure à 10 ans
- manque de données

Types des régimes hydrologiques du bassin :


- glaciaire
- nival
- pluvial
- pluvial-méditerranéen ou cévenol
- pluvio-nival
- Corridor Rhône à régime influencé

Source de données: DREAL



5. Situation des nappes d'eaux souterraines

Bassin Rhône-Méditerranée Situation des ressources en eaux souterraines fin août 2026



6. Mesures d'anticipation et de restriction des usages de l'eau

Au **1^{er} septembre 2026**, 27 départements du bassin Rhône-Méditerranée sont en vigilance ou concernés par des mesures de restriction des usages de l'eau, dont 20 départements en niveau Crise.

