

Formations principales du bassin du Buech

FORMATIONS	LOG Schématique	INDICES	LITHOLOGIE SOMMAIRE	
Eboulis		Eb - E - EV	Eboulis le plus souvent calcaireux	
Alluvions		Sal-Fgl. Pto-Pn	Alluvions éoliennes et récentes	
Fluvio-Glaciaire		Fgl - FMs	Pennasses glaciaires et fluvio-glaciaires	
Molasse rouge		MI-II-III	Argiles, marnes, gyps, conglomérats	Séries déclinées
Eocène		E7-5	calcaires en plaquettes gyps, conglomérats argiles ligniteuses	
Senonien		E6-2	calcaires en gros bancs quelques niveaux de gyps et conglomérats	
Cenoman-Turonien		E2-3	gyps, marnes et calcaires 400 - 500m.	Faciès marnés et calcaireo-marnés d'avant fosse
Marnes bleues		E-11	marnes niveau grasseux marnes } 70m	
Bérémio badoulien		n4-5	calcaire marnéux et calcaire } 140-200m	
Hauteriviens		n3	calcaires marnés 200m	
Valanginien		n2	marnes 150m	
Jurassique Supérieur		n1 J7-ab - 0-ab	calcaires marnés calcaires } 200-250	
Ternes		J4-3-2-1-5 E	marnes et miches de calcaire gypse, conglomérats, dolomites marnes schisteuses } 400 1 1200m	
Noires				

d'après Tron et Legrand, 1970