Code de la masse d'eau V2 : Etat des connaissances 2014 FRDG323

Libellé de la masse d'eau V2 : Alluvions du Rhône du confluent de la Durance jusqu'à Arles et Beaucaire et alluvions

du Bas Gardon

Date impression fiche: 12/12/2014

# 1. IDENTIFICATION ET LOCALISATION GEOGRAPHIQUE

Correspond à tout ou partie de(s) ME V1 suivante(s):

Code ME V1	Libellé ME souterraines V1
FRDG323	Alluvions du Rhône du confluent de la Durance jusqu'à Arles et Beaucaire + alluvions du Bas Gardon

#### Code(s) SYNTHESE RMC et BDLISA concerné(s)

Code SYNTHESE	Code BDLISA	Libellé ENTITE
328C2	750BF05	Alluvions quaternaires du Bas Gardon en aval de Remoulins
PAC01F	760AG03	Alluvions récentes du Rhône d'Avignon à Tarascon
PAC01H	760AG05	Alluvions récentes du Rhône de Tarascon à Arles
PAC04G1	760AH23	Alluvions du Rhône entre Beaucaire-Tarascon au Nord et St Gilles au Sud

#### Superficie de l'aire d'extension (km2) :

totale	à l'affleurement	sous couverture
276.65	276.65	0

Type de masse d'eau souterraine : Alluviale

### Limites géographiques de la masse d'eau

La masse d'eau se trouve à cheval sur deux régions, la région Languedoc-Roussillon dans sa partie ouest et la région PACA en partie est.

Elle s'étend entre Avignon et Remoulins au nord, forme une plaine alluviale plus réduite au centre entre Beaucaire et Tarascon, puis s'élargit en partie aval entre Arles et Saint Gilles. Au nord-ouest, la partie de la masse d'eau correspondant aux alluvions du Bas Gardon s'étend entre Remoulins (en aval du Pont du Gard) et la confluence avec le Rhône au niveau de Comps.

Les limites géographiques de cette masse d'eau sont :

-Limite nord-est : les massifs des Angles et de la Montagnette et la confluence de la Durance ;

-Limite est et sud-est : couloir de Graveson-Maillane et massif des Alpilles ;

-Limite ouest : les Costières de Nîmes :

-Limite sud : la Camargue et delta du Rhône ;

D	èр	ar	ter	ne	nt	(S	)
---	----	----	-----	----	----	----	---

N°	Superficie concernée (km2)					
13	78.44					
30	196.68					

District gestionnaire.	Knone et cotiers mediterraneens (L	Dassiii Kilone-Meui	iterranee-Corse)
Trans-Frontières :	Etat membre :	Autre état :	
Trans-districts :	Surface dans le district (km2) :		

Phâna et câtiora máditarranáana (hagain Phâna Máditarranáa Caraa)

Surface hors district (km2) District:

Libre et captif associés - majoritairement captif

# Caractéristiques secondaires de la masse d'eau souterraine

Caractéristiques principales de la masse d'eau souterraine :

Karst	Frange litorale avec risque d'intrusion saline	Regroupement d'entités disjointes	Existence de Zone(s) Protégée(s)
			<b>V</b>

\*Avertissement : pour les ME de type imperméable localement aquifère, les chapitres suivants s'attachent à ne décrire que les caractéristiques des quelques systèmes aquifères pouvant localement exister

# 2. DESCRIPTION DE LA MASSE D'EAU SOUTERRAINE **CARACTERISTIQUES INTRINSEQUES**

### 2.1. DESCRIPTION DU SOUS-SOL

2.1.1 DESCRIPTION DE LA ZONE SATUREE

2.1.1.1 Caractéristiques géologiques et géomètriques des réservoirs souterrains

Page 1

Libellé de la masse d'eau V2 : Alluvions du Rhône du confluent de la Durance jusqu'à Arles et Beaucaire et alluvions

du Bas Gardon

La mise en place de la plaine alluviale du Rhône entre Avignon et Arles est liée à l'histoire tectonique du Comtat. Suite à l'orogenèse alpine, le substratum crétacé s'est trouvé compartimenté sous forme de horsts et de grabens (bassin du Rhône). Au tertiaire, les transgressions favorisent le dépôt de sédiments argileux (Pliocène) qui recouvrent partiellement les reliefs crétacés. Puis au quaternaire, l'alternance des régressions et des transgressions donne lieu à la mise en place de différentes formations détritiques (Costières), et enfin aux dépôts des alluvions récentes en fond de vallée.

La masse d'eau correspond principalement aux alluvions récentes d'âge quaternaire (et cailloutis villafranchiens) du Rhône, constituées par un mélange hétérogène de nature plutôt grossière: sables, graviers et galets surmontés de limons isolant les niveaux graveleux de la surface (notamment en aval de Beaucaire-Tarascon). Le réservoir présente une épaisseur moyenne de 20 à 25 m environ. L'épaisseur des limons est variable, s'accroissant d'amont en aval le long du Rhône et en général plus importante aux abords du massif de la Montagnette (environ 5 m).

Les alluvions anciennes (Würm) forment une terrasse et peuvent être associées sur le plan hydrogéologique aux alluvions récentes. Elles sont peu épaisses (4 à 5 m) mais beaucoup plus continues, notamment en rive droite du Bas Gardon. Elles sont constituées de sable et de galets en proportions variables et sont très souvent recouvertes de colluvions sablo-limoneuses.

Le substratum géologique sur lequel reposent les alluvions du Rhône, entre Aramon et Beaucaire, est constitué par :

-Les calcaires du Crétacé inférieur, surtout présents en rive gauche du Rhône (massif de la Montagnette et des Alpilles) et dans une moindre mesure en rive droite (massifs des Angles et de Beaucaire);

-Les formations détritiques tertiaires, essentiellement d'âge pliocène (Plaisancien), affleurant principalement dans les collines et plateaux de la rive droite (principalement argiles).

La basse vallée alluviale du Gardon est rattachée à la masse d'eau. Elle correspond à un décrochement oligocène sur lequel est calqué le rebord nord-est de la Costière. Les plis de la rive droite du Rhône sont d'âge oligocène à direction pyrénéenne. Les alluvions quaternaires du Bas Gardon sont constituées par des terrains limono-sableux qui forment un ensemble presque aplani où l'altitude varie entre 10 et 20 m seulement. Le substratum des alluvions récentes du Bas Gardon correspond aux formations miocènes ou le plus souvent pliocènes, essentiellement argileuses.

Lithologie dominante de la masse d'eau

Alluvions

#### 2.1.1.2 Caractéristiques géométriques et hydrodynamiques des limites de la masse d'eau

Les limites hydrodynamiques sont les suivantes :

- + au Nord-Est : limite d'alimentation depuis les alluvions du Rhône du défilé de Donzère à la confluence avec la Durance (FRDG382).
- + à l'Ouest : la masse d'eau est alimentée par les formations d'alluvions anciennes des Costières (FRDG101).
- + à l'Est : limite d'alimentation depuis les massifs calcaires des Alpilles et de la Montagnette (FRDG204) ainsi que depuis les alluvions de la Durance et du couloir de Graveson-Maillanne (FRDG.
- + au Sud : une alimentation des cailloutis de la Crau (FRDG104) a lieu sous le recouvrement des formations peu perméables de la Camargue. Les relations sont non connues à la limite avec le domaine des limons et alluvions quaternaires du bas Rhône et Camargue (FRDG504).
- + le substratum pliocène imperméable constitue une limite étanche sur une bonne partie de la masse d'eau.

Les alluvions du bas Gardon présentent les limites suivantes :

- + Limite nord-ouest : alimentation de la nappe alluviale par le karst urgonien du Bas gardon (FRDG128), en période de crue, entre le pont du Gard et Remoulins.
- + Limite ouest et est : limite « étanche » constituée par les formations semi-perméables du Miocène ou Pliocène (FRDG101 et FRDG518).
- + Limite sud : ligne d'affluence vers les alluvions du Rhône.

# 2.1.2 DESCRIPTION DES ECOULEMENTS

#### 2.1.2.1 Recharges naturelles, aire d'alimentation et exutoires

Recharge naturelle:

-échanges avec les eaux de surface (Rhône, Gardon) ;

-alimentation de la nappe du Rhône par la nappe alluviale du bas Gardon ;

-infiltration des précipitations : l'aire d'alimentation correspond peu ou prou à toute la zone d'affleurement des alluvions ;

-apports issus du substratum (massifs calcaires karstifiés : Alpilles, Montagnette, Beaucaire,...).

L'exutoire de la masse d'eau correspond à la nappe de la Crau et aux formations de la Camargue. Les relations ne sont pas connues.

Types de recharges : Pluviale ✓ Pertes ☐ Drainance ✓ Cours d'eau ✓ Artificielle ✓

## Si existence de recharge artificielle, commentaires

Des réinjections sont effectuées par EDF à titre de compensation des aménagements de la Durance (2 centres de réinjection : 10 Mm3/an au total) en hiver dans le sous-secteur nord, les pertes des canaux agricoles complètent ces apports à la nappe. Le volume injecté annuellement est estimé à 76 Mm3.

qualité : bonne; moyenne; approximative

source : technique; expertise

# 2.1.2.2 Etat(s) hydraulique(s) et type(s) d'écoulement(s)

La nappe alluviale du Rhône est généralement captive. Les épandages limoneux peu perméables du Flandrien forment une couverture d'épaisseur pluri métrique qui met en charge l'eau au sein des niveaux graveleux. L'épaisseur de la couverture limoneuse peut atteindre 5 m aux abords des massifs de la Montagnette et des Alpilles. Le caractère captif de la nappe est plus marqué en partie sud de la masse d'eau, en aval de Beaucaire-Tarascon. La nappe est en liaison hydraulique avec le Rhône et s'écoule vers le sud. Les écoulements sont de type poreux.

Les alluvions récentes du Bas Gardon sont en liaison hydraulique avec le Gardon et avec le Rhône au niveau de la confluence Gardon et Rhône. A la confluence entre le Gardon et le Rhône, le Rhône peut alimenter directement la nappe alluviale drainée alors par le Gardon, notamment au sud de la commune de Montfrin.

Type d'écoulement prépondérant : poreux

#### 2.1.2.3 Piézomètrie, gradient et direction d'écoulement

La nappe alluviale est peu profonde (environ 4 m/sol en moyenne, 8 m localement) et peut être sub-affleurante par endroits (dans sa partie captive). Elle

Code de la masse d'eau V2 : Etat des connaissances 2014 **FRDG323** 

Libellé de la masse d'eau V2 : Alluvions du Rhône du confluent de la Durance jusqu'à Arles et Beaucaire et alluvions

du Bas Gardon

est en liaison hydraulique avec le Rhône et s'écoule selon une direction principale nord-sud. Entre Avignon et Tarascon, le fleuve à tendance à l'alimenter dans la moitié nord de la masse d'eau et à la drainer en partie sud. La piézométrie de la nappe alluviale est influencée par le Gardon, à l'ouest, et par la nappe de Graveson-Maillane, à l'est.

Les écoulements dans les cailloutis rejoignent probablement ceux de la Crau qui plongent sous les limons de Camarque au sud d'Arles, mais la rareté des données ne permet pas d'étayer cette hypothèse.

#### 2.1.2.4 Paramètres hydrodynamiques et vitesses de transfert

Les alluvions récentes de la basse vallée du Rhône sont constituées de sédiments de nature grossière présentant d'assez bonnes qualités hydrauliques. Des essais de pompages dans les secteurs de Vallabrèques et de Boulbon ont donné des valeurs de perméabilité comprises entre 2 et 3.10-3 m/s ainsi que des valeurs de transmissivité comprises entre 5 et 6.10-2 m2/s.

Le matériel alluvial autorise souvent des prélèvements importants au voisinage des écoulements de surface qui les traversent : le débit de ces prélèvements reste fonction de la cote des écoulements et des possibilités de réalimentation du réservoir aquifère, parfois limitée par colmatage des berges.

# 2.1.3 Description de la zone non saturée - Vulnérabilité

Epaisseur de la zone non saturée :

De manière générale, la vulnérabilité de la nappe alluviale du Rhône vis-à-vis des pollutions de surface est faible à modérée sous recouvrement limoneux. Elle peut être localement forte dans les zones de faible recouvrement.

Malgré la forte perméabilité des alluvions et la faible profondeur des niveaux d'eau, la nappe du Rhône est moyennement vulnérable vis-à-vis des pollutions de surface, voire faiblement vulnérable en partie aval, où la couverture limoneuse conduit à des mises en charges plus marquées. La nappe des alluvions du bas Gardons est quant à elle vulnérable dans les zones ou les niveaux limoneux de couverture sont absents ou présentent une épaisseur réduite. Ces derniers peuvent atteindre localement 3 à 5 m et rendre la nappe semi-captive.

'Avertissement : les 2 champs suivants ne sont renseignés que pour les ME présentant une homogénéité (essentiellement ME de type alluvionnaire)

Perméabilité de la zone non saturée :

faible (e<5 m)	Perméable : 10-3 <k>10-6 m</k>		
qualité de l'information sur la ZNS :	moyenne	source : technique	
*Avertissement : la caractérisation des li imperméables car non pertinente	ens avec les eaux de surface	et les zones humides n'est pas rens	eignée pour des ME globalement

# 2.2 CONNEXIONS AVEC LES EAUX DE SURFACE ET LES ECOSYSTEMES TERRESTRES ASSOCIES

\*Avertissement : pour les cours d'eau, la qualification de la relation avec la ME souterraine, rend compte de la relation la plus représentative à l'échelle de la ME de surface en situation d'étiage

# 2.2.1 Caractérisation des échanges Masses d'eau Cours d'eau et masse d'eau souterraine :

Code ME cours d'eau	Libellé ME cours d'eau	Qualification Relation	
FRDR2008	Le Rhône d' Avignon à Beaucaire	Pérenne drainant	<del></del>
FRDR2008a	Bras d'Avignon et ses annexes	Pérenne drainant	
FRDR2008b	Vieux Rhône de Beaucaire	Pérenne drainant	
FRDR2009	Le Rhône de Beaucaire au seuil de Terrin et au pont de Sylveréal	Indépendant de la nappe	
FRDR3108a	Le canal du Rhône à Sète entre le Rhône et le seuil de Franquevaux	Pas d'information / Non qualifiable	
FRDR377	Le Gard de Collias à la confluence avec le Rhône	Pérenne drainant	

#### Commentaires:

La nappe alluviale est en liaison hydraulique avec le Rhône et s'écoule selon une direction principale nord-sud.	
Globalement, le fleuve a tendance à drainer la nappe alluviale. Localement, en fonction de la géométrie du cours d'eau, les échanges peuvent	
s'inverser. Ainsi, entre Avignon et Tarascon, le fleuve à tendance à l'alimenter dans la moitié nord et à la drainer en partie sud.	
qualité info cours d'eau : honne Source : technique	

#### 222

Caractérisation des échange	s Masses d'eau Plan	d'eau et masse d'eau	u souterraine :		
Commentaires :					
Néant				 	
qualité info plans d'eau :		Source :			
O		A413			

### 2.2.3 Caractérisation des échanges Masses d'eau Eaux côtières ou de transition et masse d'eau souterraine :

# Commentaires :

Libellé de la masse d'eau V2 : Alluvions du Rhône du confluent de la Durance jusqu'à Arles et Beaucaire et alluvions

du Bas Gardon

qualité info ECT :	Source :		

#### 2.2.4 Caractérisation des échanges ZP habitats et Oiseaux avec la masse d'eau souterraine :

CodeZP	Libellé ZP	Type ZP	Qualification relation
FR9301590	LE RHONE AVAL	SIC 2011	Avérée forte

#### 2.2.5 Caractérisation des échanges Autres zones humides avec la masse d'eau souterraine :

ID DIREN	ID SPN	Libellé	Réferentiel	Qualification relation
13136100	930012415	CAMARGUE FLUVIO-LACUSTRE ET LAGUNO-MARINE	ZNIEFF2	Avérée forte
13138159	930020207	Île de Saxy	ZNIEFF1	Avérée forte

#### Commentaires:

La zone protégée Rhône aval correspond au lit majeur du Rhône et dépend fortement de la nappe alluviale du Rhône. La qualité des eaux de la nappe et le niveau piézométrique sont d'une importance majeure pour la conservation de la zone humide.

La masse d'eau est partiellement alimentée, dans la zone de confluence, par les eaux de la nappe alluviale de la Durance. Les relations sont donc faibles et dans le sens d'une relation des zones humides vers la nappe alluviale du Rhône.

De la même façon, la masse d'eau est partiellement alimentée, dans la zone de confluence, par les eaux de la zone humide des Marais de la Vallée des Baux. Les relations sont donc faibles et dans le sens d'une relation des zones humides vers la nappe du Rhône.

Cette richesse écologique est attestée par la présence de quelques zones d'intérêt écologique, correspondant en totalité ou en partie à des zones humides.

qualité info ZP/ZH : moyenne Source : technique

#### 2.2.6 Liste des principaux exutoires :

# 2.3 ETAT DES CONNAISSANCES ACTUELLES SUR LES CARACTERISTIQUES INTRINSEQUES

Le niveau des connaissances de l'aquifère est globalement bon dans sa partie amont, plus exploitée. En revanche, les connaissances sont moins précises dans la partie aval où la nappe est peu exploitée.

Peu de sondages profonds ont été effectués dans la basse vallée du Gardon ; on dispose ainsi de peu d'informations sur la nature et l'épaisseur des alluvions,; et sur le substratum. Par contre, de nombreux sondages ont été effectués à proximité du cours actuel du Rhône par la Compagnie Nationale du Rhône.

Une étude d'identification et de protection des ressources en eau stratégiques des nappes alluviales du Rhône pour l'alimentation en eau potable est actuellement en cours de réalisation (ANTEA-SAFEGE).

# 3. INTERET ECONOMIQUE ET ECOLOGIQUE DE LA RESSOURCE EN EAU

### Intérêt écologique ressource et milieux aquatiques associés:

Cette masse d'eau présente un intérêt écologique majeur.

Elle participe en deux nombreux secteurs à la suralimentation du cours d'eau, notamment en période estivale. A ce titre, elle joue un rôle important pour les milieux aquatiques associés au corridor alluvial, qui font l'objet d'une protection réglementaire NATURA2000.

Dans sa partie de Donzère-Mondragon à la Méditerranée (environ 150 kilomètres), Le Rhône présente une grande richesse écologique, notamment plusieurs habitats naturels et espèces d'intérêt communautaire. Grâce à la préservation de certains secteurs, de larges portions du fleuve sont exploitées par des espèces remarquables. L'axe fluvial assure un rôle fonctionnel important pour la faune et la flore: fonction de corridor (déplacement des espèces tels que les poissons migrateurs), fonction de diversification (mélange d'espèces montagnardes et méditerranéennes) et fonction de refuge (milieux naturels relictuels permettant la survie de nombreuses espèces). Les berges sont caractérisées par des ripisylves en bon état de conservation, et localement très matures (présence du tilleul).

De la bonne gestion quantitative et qualitative de cette masse d'eau, dépend donc le bon état écologique de ces milieux aquatiques.

#### Intérêt économique ressource et milieux aquatiques associés:

L'intérêt économique de cette masse d'eau est exceptionnel.

Elle représente l'une des masses d'eau les plus contributives de la région PACA en termes de prélèvements. Selon l'Agence de l'eau RM&C, en 2010, les prélèvements connus sur la nappe sont estimés à environ 26 Mm3/an. La nappe alluviale du Rhône est identifiée comme aquifère stratégique pour un usage d'eau potable dans le SDAGE Validé en 2009.

La nappe est intensément exploitée pour les besoins domestiques, agricoles et industriels. Le principal captage pour l'alimentation en eau potable est celui de Comps, situé à l'aval direct du confluent du Gardon. La ville de Nîmes tire de ce champ captant la quasi totalité de son alimentation en eau de consommation.

L'entité du bas Gardon est essentiellement exploitée pour l'alimentation en eau potable des communes de Remoulins (2 ouvrages), de Montfrin, de Comps, du syndicat du Pont du Gard et de Fournés.

Selon l'Agence de l'eau RM&C en 2007, dans le secteur entre Avignon et Tarascon, les prélèvements connus sur la nappe se sont élevés à environ 20.5 millions de m3/an, dont 17.5 millions pour les captages AEP. Aucun prélèvement n'a été recensé en partie aval, entre Tarascon et Arles. Dans le secteur du Bas Gardon, les prélèvements AEP sont évalués à 1 million de m3/an.

L'intérêt économique de cette masse d'eau est également important pour la production d'hydroélectricité, compte-tenu des débits dérivés par les prises d'eau sur le Rhône.

Libellé de la masse d'eau V2 : Alluvions du Rhône du confluent de la Durance jusqu'à Arles et Beaucaire et alluvions

du Bas Gardon

# 4. REGLEMENTATION ET OUTILS DE GESTION

# 4.1. Réglementation spécifique existante :

néant

### 4.2. Outil et modèle de gestion existant :

néant

# 5. BESOINS DE CONNAISSANCE COMPLEMENTAIRE

## 6. REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES PRINCIPALES

Salquèbre D., Gandolfi J.M. - 2011 - Appui technique sur la connaissance des eaux souterraines dans le cadre du « SOURSE » - « Schéma d'Orientations pour une Utilisation Raisonnée et Solidaire de la ressource en Eau en PACA » - 23 p., 3 ill., 1 ann.

SOGREAH - 2010 - Schéma d'orientations pour une utilisation raisonnée et solidaire de la ressource en eau - Rapport de diagnostic, version 2.1b de septembre 2010, 197 p.

SAFEGE - 2009 - Nappes alluviales du Rhône - Identification et protection des ressources en eau souterraine stratégiques pour l'alimentation en eau potable - Rapport provisoire de phase 1.

DREAL PACA, Agence de l'Eau RM&C - 2009 - Diagnostic de la gestion quantitative de la ressource en eau en région PACA - Rapport d'étude, 142 p., 19 annexes.

Agence de l'Eau RM&C - 2009 - Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux. SDAGE et documents d'accompagnements - Programme de mesures - rapport d'évaluation environnementale. -

Monjuvent G., Masse J.P., Ballessio R., Alabouvette B., Masse P.J., Blavoux B., Dupias G., Granier J., Philip J. - 1991 - Notice explicative de la carte géologique au 1 : 50 000 de Avignon - Document BRGM, 90 n

L'Homer A., Roux M., Toni C., Bazille F., Damiani L., Durozoy G. - 1987 - Notice de la carte géologique au 1 : 50 000 de Arles - Document BRGM, 73 p.

BRGM - 1985 - Synthèse hydrogéologiques de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Quantité –Qualité, état des connaissances en 1985 - Fiches de synthèse, notice et documents d'accompagnement, cartes

Catzigras, F., Colomb E., Damiani L., Durand J.P., Durozoy G., Féraud J., Gervais J., Masse J.P., Rouire J., Rousset C., Triat J.M., Truc G. - 1977 - Notice explicative de la carte géologique au 1 : 50 000 de Chateaurenard - Document BRGM, 25 p.

Ménillet F, Paloc H. - 1973 - Notice explicative de la carte géologique au 1 : 50 000 de Nîmes document BGRM, 42 p. -

Cabinet d'études RUBY - 1965 - La nappe alluviale du Rhône dans la région de Tarascon - Rapport d'étude.

Cabinet d'études RUBY - 1965 - La nappe alluviale du Rhône dans la plaine de Vallabrègues – Tarascon - Rapport d'étude

# 7. EXISTENCE DE ZONES PROTEGEES AEP

Existence	de	prélèvem	ents	AEP	> 10	m3/j
ou desser	van	t nlue da	50 h	ahitai	nte	



Enjeu ME ressources stratégiques pour AEP actuel ou futur

Zones stratégiques délimitées

Zones stratégiques restant à délimiter

# Commentaires :

Secteur à enjeu Eau Potable (Beaucaire , St Gilles) pour le 30

#### Identification de zones stratégiques pour l'AEP future

Libellé zone stratégique	Type zone	Zone d'étude	Autres ME limitrophes concernées par la zone
Confluence Durance - Rhône	Zone d'Intérêt Futur	Alluvions du Rhône	FRDG359
Rive droite à Aramon	Zone d'Intérêt Futur	Alluvions du Rhône	
Rive gauche à Vallabrègues	Zone d'Intérêt Futur	Alluvions du Rhône	
Forages Plaine des Angles	Zone d'Intérêt Actuel	Alluvions du Rhône	
Puits Aval de Nîmes Comps	Zone d'Intérêt Actuel	Alluvions du Rhône	

Libellé de la masse d'eau V2 : Alluvions du Rhône du confluent de la Durance jusqu'à Arles et Beaucaire et alluvions

du Bas Gardon

8. PRES	SIONS ET IN	IPACTS SU	JR L'ETAT DES EAUX SO	DUTERRA	INES
8.1 OCCUPATION GEN	ERALE DES SO	LS			
Surfaces (d'après Corine l	and Cover 2006) e	n % de la surface	totale:		
Territoires artificialisés		7.6 %	Territoires agricoles à faible impa	ct potentiel	0.4 %
Zones urbaines 5.6			Prairies	0.4	
Zones industrielles		2	Territoires à faible anthropisation		13 %
Infrastructures et transp	orts	0	Forêts et milieux semi-naturels	3.7	13 70
Territoires agricoles à for	t impact potentiel	79 %	Zones humides	0	
Vignes		11.2	Surfaces en eau	8.9	
Vergers		13.3			
Terres arables et culture	s diverses	54.9			
Commentaires sur l'occup	oation générale de	s sols			
Secteur très agricole (serres	s. vergers, vignes).	surtout dans le se	ecteur de Châteaurenard, dans le sous	-secteur nord.	
Dans le sous-secteur sud, la					
qualité : bonne;	a pression agricole	ost momo forto (p	ramos, grandos saltaros).		
source : technique;					
8.2 VOLUMES PRELEV	ES EN 2010 répa	ırtis par usage	(données Redevances Agence	de l'Eau RMC	)
Usage Prélèvements AEP	Volun	ne prélevé (m3) 20256800	Nombre de pts % vo	ol .9%	
Prélèvements agricoles		1598900		6%	
Prélèvements carrières		528600		2%	
Prélèvements industriels		1769200	15 7.	3%	
Total		24 153 500			
8.3 TYPES DE PRESSI	ONS IDENTIFIEE	S			
Type(s) de pression identifiée	Impact sur l'état de	s eaux souterraines (	Origine RNAOE Commentaires		Polluants à l'origine du RNAOE 2021
Pollutions ponctuelles	Moyen ou localisé				
Agriculture - Azote	Faible				
Agriculture - Pesticides	Moyen ou localisé		Peu de points déclassés		
Prélèvements	Moyen ou localisé				
8.4 ETAT DE CONNAIS	SANCE SUD LE	e ddeesione			
			n ava la contribution de abacuna n'ait	naa átá nrásiaá	mont évaluée. Les proceions cont
			n que la contribution de chacune n'ait la Durance tant sur le plan agricole qu		
-					
9.	_	_	ION RISQUE DE NON AT		ES
	OBJECT	IFO ENVIR	RONNEMENTAUX (RNAC	/L) 2021	
Tendance évolution Pr	ressions de pollut	on:		RNAOE	QUALITE 2021
Délai renouvellement	•		ntes 2013 (années) : 10		non

Libellé de la masse d'eau V2 : Alluvions du Rhône du confluent de la Durance jusqu'à Arles et Beaucaire et alluvions

du Bas Gardon

Tendance évolution Pressions de prélèvements :

**RNAOE QUANTITE 2021** 

non

# **10. ETAT DES MILIEUX**

Etat quantit	atif: Bon			Etat	t chimique : Bon	ı		
Niveau de c	onfiance de l'éva	luation :	Faible	Nive	eau de confiance de	l'évaluation :	Moyen	
Commentai	res :			Cor	mmentaires :		L	
				- 18 pas - 1 <sup>-</sup> A r - de Syr - de par - ur	r la période 2006-2017 8 points avec des don s globalement d'indice 7 points avec des don noter : es contaminations por ndicat de Domazan-Es es indices de dégrada r les pesticides sur le o n résultat en 2006 pou 654X0358/P situé à Va ponibles	nées nitrates, to es de dégradation nées pesticides, nctuelles en pes stezargues 0966 tition par les nitra captage de Sain ur l'arsenic à des	on ticides sur un de 61X0247/P situé tates et par une c nt-Gilles 09922X s concentrations	es puits du à Aramon ontamination 0228/S de 29 µg/l sur
Si état quantitatif médiocre, raisons :				Si	état chimique médic	ocre, raisons :		
Si impact E	SU ou écosystèr	nes, type c	d'impact :	l Pa	ıramètres à l'origine	de l'état chimic	que médiocre	
				Co	ommentaires sur les	caractéristique	es hydrochimiq	ues générales
				Co	ommentaires sur exis	stence éventue	lle fond géochi	mique naturel
Liste des cap	otages abandonn	és sur la p	période 1998-2008	ļ				
ode siseaux	Code BSS	Nom		INSEE	Commune	Motif a	abandon	Année abando
30000239	09924X0224/AEP	CAPTAGE DE L	A GARE	30117	FOURQUES	Autre paran	mètre	2004

## 10.3 NIVEAU DE CONNAISSANCE SUR L'ETAT DES EAUX SOUTERRAINES